

## Overdracht en wijziging bij gekoppelde medicatie

Het Portaal ontvangt regelmatig meldingen van incidenten rondom medicatie die voorgeschreven wordt om te voorkomen dat een ander geneesmiddel bijwerkingen geeft. Het stoppen van het ene middel zou dan gepaard moeten gaan met het stoppen van het andere middel.

### Casus

*Een patiënt kreeg prednisolon. Hierbij werd Lantus gegeven om hoge bloedsuikerspiegels als gevolg van de prednisolon te voorkomen. De prednisolon werd volgens schema afgebouwd. De Lantus bleef echter op de toedieningslijst en werd nog steeds toegediend. Daarbij werden de bloedsuikers erg laag.*

### Risico

Bij een wijziging of bij overdracht is het niet altijd duidelijk dat bepaalde medicatie een “koppel” vormt. Hierdoor kan bij wijzigingen een middel ongemerkt worden door gebruikt, hoewel dat niet nodig is.

Soortgelijke casuïstiek ziet het Portaal ook regelmatig bij andere gekoppelde middelen, bijvoorbeeld bij NSAID's en maagzuurremmers.

Bij de nieuwe bouwstenen Medicatie Proces (MP 9.x) is het mogelijk om het verband tussen geneesmiddelen vast te leggen en over te dragen.

Zie [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V9.0.7\\_Ontwerp\\_medicatieproces](https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V9.0.7_Ontwerp_medicatieproces).

In de huidige softwaresystemen is dit echter nog niet beschikbaar.

### Tijdelijke oplossing

Leg in de vrije tekst bij beide middelen vast dat het middel in verband staat met een ander middel. Bij Prednisolon kan worden toegevoegd: “in verband met Prednisolon ook Lantus gebruiken.” Bij de Lantus zou de opmerking “in verband met gebruik Prednisolon” kunnen worden toegevoegd. Bij wijziging of overdracht is dan zichtbaar dat er een relatie is tussen de middelen.